

トマト・キュウリ・メロン共通の対策（出さない対策）

① ハウスを密閉し、害虫の逃げ道をふさいでから、一斉に植物を枯らしめます。



作物は株元から切るか、根から引き抜き、ハウス内の雑草も除草します。

天候不順で作物の枯死に時間がかかると予想される場合はキルパー等古株枯死に利用できる薬剤の併用も検討してください

② ハウス内の植物が完全に枯れてから10日以上続けて密閉し、害虫を死滅させましょう。



ウイルスの伝染環(つながり)を断ち切るため、作物が栽培されていない期間を設けましょう。

トマト・キュウリ・メロン共通の対策（入れない対策）

タバココナジラミ類やアザミウマ類は、一つの方法だけで防除することは難しいため、様々な方法を組み合わせて結果的に減らしていくことが重要です。

- ① UVカットフィルム(育苗) + 防虫ネット + 二重トビラ
- ② 粘着版の設置 (黄色: コナジラミ、青: アザミウマ)
- ③ 育苗期処理剤 . . . 等

除草
(周辺環境の整備)



運搬時にも入れない対策を!

トマト黄化葉巻病防除対策

黄化葉巻病の場合、タバココナジラミは、体内にウイルスを取り込むと死ぬまでウイルスを伝染することができます。

タバココナジラミ成虫の寿命は約20~30日です。地域でトマトの作付が無い期間を30日以上設けると、ウイルスを持ったタバココナジラミは殆どいなくなります。

6月			7月			8月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
<p>野良生えトマトもビニールを被覆して枯らします</p> <p>6月末までに栽培終了</p>			<p>ウイルスを持つコナジラミの寿命 約30日</p> <p>地域にトマトがない期間を30日以上設ける</p>			<p>8月以降に定植し、ウイルスを持ったコナジラミの飛び込みを防ぐ</p>		