

目次

1 栽培技術

| | | | |
|---------------------|-------|---------------------|---------|
| トマト | | 早熟 | 73-74 |
| 促成 | 1-4 | 抑制 | 75-76 |
| 夏秋雨よけ | 5-7 | 小玉スイカ（促成） | 77-79 |
| 無加温抑制 | 8-11 | 立体スイカ（促成） | 80-81 |
| 加温抑制 | 12-15 | 種なし | 82-84 |
| ミニトマト | | メロン | |
| 抑制無加温 | 16-18 | プリンス | 85-88 |
| 促成 | 19-21 | イエローキング （キンショウ） | 89-91 |
| ナス | | ホームランスター | 92-94 |
| 促成 | 22-26 | アンデス | 95-98 |
| 早熟 | 27-28 | 肥後グリーン | 99-102 |
| 露地 | 29-31 | クインシー （半促成立体・地這） | 103-105 |
| ハウス抑制 | 32-33 | アールス 春作 | 106-110 |
| ヒゴムラサキ | 34-37 | 夏作 | 111-114 |
| ピーマン | | 秋作 | 115-120 |
| 促成 | 38-40 | 秋冬作 | 121-124 |
| 夏秋雨よけ | 41-42 | 冬作 | 125-127 |
| カラーピーマン （パプリカ含む） | 43-44 | カボチャ | |
| キュウリ | | 半促成 | 128-129 |
| 促成 | 45-47 | 早熟 | 130-132 |
| 半促成 | 48-50 | 小型カボチャ | 133-134 |
| 夏秋雨よけ | 51-54 | イチゴ | |
| 高原露地 | 55-57 | ＜ひのしづく＞ | |
| ハウス抑制無加温 | 58-60 | 普通ポット育苗 | 135-144 |
| ハウス抑制加温 | 61-63 | 夜冷短日育苗 | 145-154 |
| 暖地露地抑制 | 64-65 | ＜さがほのか＞ | |
| スイカ | | 普通ポット育苗 | 155-163 |
| 促成 | 66-70 | 準高冷地 | 164-172 |
| 半促成 | 71-72 | ＜とよのか＞ | |
| | | 高設栽培 | 173-180 |

| | | | |
|-----------|---------|----------|---------|
| ハクサイ | | ゴボウ | |
| 秋まき | 181-182 | 春まき・秋まき | 229-230 |
| 冬まき | 183-184 | 水田トンネル | 231-232 |
| キャベツ | | サトイモ | |
| 高原春まき・夏まき | 185-186 | トンネル早掘り | 233-235 |
| 平坦地夏まき | 187-189 | マルチ早掘り | 236-237 |
| 平坦地秋まき | 190-191 | 普通掘り | 238-240 |
| カリフラワー | | ハウス早掘り | 241-243 |
| 夏まき・冬まき | 192-194 | バレイショ | |
| ブロッコリー | | 春 作 | 244-246 |
| 平坦地夏まき | 195-196 | 秋 作 | 247-248 |
| 平坦地冬まき | 197-199 | カンショ | |
| レタス | | 早掘りマルチ | 249-250 |
| 平坦地夏まき | 200-201 | 普通掘り | 251-252 |
| 平坦地秋まき | 202-203 | シヨウガ | |
| ホウレンソウ | | ハウス・トンネル | 253-254 |
| 高原雨よけ | 204-206 | 露 地 | 255-257 |
| 平坦地露地 | 207-209 | 葉シヨウガ | 258-259 |
| セルリー | | レンコン | |
| ハウス冬どり | 210-212 | ハウス | 260-262 |
| ハウス春どり | 213-214 | トンネル | 263-264 |
| 露 地 | 215-216 | 普 通 | 265-266 |
| ダイコン | | タマネギ | |
| 高 原 | 217-218 | 早出し・普通 | 267-271 |
| 平坦地秋まき | 219 | セット栽培 | 272-273 |
| 平坦地冬まき | 220-221 | ネギ | |
| カブ | | 葉ネギ | 274-276 |
| コカブ (周年) | 222-223 | 深ネギ春まき | |
| ニンジン | | 深ネギ秋まき | 277-279 |
| 夏まき | 224-225 | コネギ周年 | 280-282 |
| 冬まき | 226-228 | ワケギ | |
| | | 露 地 | 283-285 |

| | |
|-----------|---------|
| インゲン | |
| ハウス促成 | 286-287 |
| ハウス半促成 | 288-289 |
| トンネル早熟 | 290-291 |
| 露地抑制 | 292-293 |
| ハウス抑制 | 294-295 |
| サヤエンドウ | |
| 秋まき | 296-297 |
| エダマメ | |
| トンネル早熟・普通 | 298-301 |
| ソラマメ | |
| ハウス | 302-303 |
| トンネル | 304-305 |
| 露地 | 306-307 |
| スイートコーン | |
| ハウス | 308-309 |
| トンネル | 310-311 |
| 露地 | 312-313 |
| オクラ | |
| トンネル・早熟 | 314-315 |
| 露地 | 316-317 |
| アスパラガス | |
| ハウス | 318-320 |
| チンゲンサイ | |
| 高原 | 321-322 |
| 平坦地 | 323-324 |
| ニラ | |
| 周年 | 325-327 |
| ニガウリ | |
| 半促成 | 328-330 |
| 抑制 | 331-333 |

| | |
|-------|---------|
| ハウス早熟 | 334-336 |
|-------|---------|

| | |
|--------|---------|
| その他野菜 | |
| ラッキョウ | 337-338 |
| ニンニク | 339-340 |
| ヤマイモ | 341-342 |
| モロヘイヤ | 343-344 |
| 阿蘇タカナ | 345-346 |
| ハナミョウガ | 347-349 |
| ミツバ | 350-351 |
| オオバ | 352-353 |
| シュンギク | |
| 冬春どり | 354-355 |
| 夏 秋 | 356-357 |
| セリ | 358-360 |
| パセリ | 361-363 |
| スイゼンジナ | 364-365 |
| フキ | 366-367 |
| ハワサビ | 368-369 |
| タケノコ | 370-371 |
| タラノメ | 372-373 |

2 中国野菜ほか

| | |
|-------------|---------|
| ショウサイ (紹菜) | 374 |
| ハナニラ (韭菜台) | 375 |
| カイラン | 376 |
| サイシン (菜心) | 377 |
| 紅葉苔 (紅葉花) | 378 |
| ツルムラサキ | 379 |
| バイアム (ヒユナ) | 380 |
| ちりめんチシャ | 381-382 |
| コスレタスとミニレタス | 383-384 |
| サラダナ | 385 |
| セルタス | 386 |
| オカヒジキ | 387 |
| カイワレダイコン | 388 |
| 葉ダイコン | 389 |
| コールラビ | 390 |

| | |
|-------------------|---------|
| 芽キャベツ | 391 |
| ミニニンジン | 392 |
| 20日ダイコン | 393 |
| タカナ | 394-395 |
| ミズナ | 396-397 |
| コマツナ | 398-400 |
| 甘トウガラシ | 401-402 |
| シシトウ | 403-404 |
| ズッキーニ | 405 |
| 耐暑性野菜 | 406-407 |
| マコモダケ | 408-409 |
| ナバナ | 410-411 |

3 参考資料

| | |
|----------------------------|---------|
| (1) 気象一覧 | 412-415 |
| (2) 語句説明 | 416-418 |
| (3) 作型図での記号とその意味 | 419 |